

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Valle Olona</p>	<p>Tabella UO Medicina Nucleare PO Saronno Informazioni per esecuzione di SCINTIGRAFIA MIOCARDICA PERFUSIONALE</p>	<p>Cod.:TAB19DI01NUCPBA Data 08.11.2019 Rev 1 Pagina1 di 1</p>
---	---	---

Il / la sig.
 deve presentarsi presso il Servizio di Medicina Nucleare di questo ospedale
 il giorno alle ore
 per eseguire la SPECT miocardica con test provocativo di ischemia miocardica;
 ed il giorno alle ore
 per eseguire la SPECT miocardica basale.

Circa due ore prima della esecuzione dell'esame può essere consumato un pasto leggero.
 NELLE 24 ORE CHE PRECEDONO L'ESAME NON DEVONO ESSERE ASSUNTI TE',
 CAFFE', CIOCCOLATA, COCA-COLA, BANANE E FARMACI CHE CONTENGONO
 CAFFEINA O TEOFILLINA.

IL / LA PAZIENTE DEVE PREVENTIVAMENTE CONSULTARE IL MEDICO E/O IL
 CARDIOLOGO CURANTE PER DEFINIRE LA EVENTUALE SOSPENSIONE DEI FARMACI
 CORONARO-ATTIVI.

Si rammenta che:

- abitualmente non interferiscono con l'esecuzione della SPECT miocardica i farmaci ACE-inibitori, inibitori della angiotensina 2°, alfa-bloccanti, antiaggreganti piastrinici, anticoagulanti, diuretici, digitalici, antiaritmici
- i farmaci che devono essere abitualmente sospesi in caso di SPECT miocardica diagnostica sono i nitroderivati, i calcio-antagonisti e i beta-bloccanti
- i farmaci broncodilatatori che contengono teofillina ed analoghi della teofillina abitualmente assunti dai pazienti asmatici non possono essere utilizzati in caso di SPECT miocardica con infusione di dipiridamolo
- **il paziente può comunque utilizzare i nitroderivati per via sub-linguale (Trinitrina, Carvasin o Natispray) in caso di dolore anginoso.**

SPAZIO RISERVATO AL CARDIOLOGO O AL MEDICO CURANTE PER LE INDICAZIONI
 TERAPEUTICHE (SOSPENSIONE O PROSEGUIMENTO DELLA TERAPIA CORONARO-
 ATTIVA):

.....

Il / la paziente deve portare con sé tutta la DOCUMENTAZIONE CARDIOLOGICA e i farmaci
 abitualmente assunti.

Il paziente deve essere in possesso di due impegnative mediche:

- **una per:**
 tomoscintigrafia miocardio (SPET) di perfusione a riposo (6192092.02)
 tomoscintigrafia miocardio (SPET) di perfusione dopo stimolo (6192092.01)
- **una per:**
 test cardiovascolari da sforzo con pedana mobile (088941)

In caso di impedimento all'esecuzione dell'esame il paziente è invitato a comunicarlo il più presto
 possibile al n. tel. 02.9613394 - 9613470.